V Sessione:
La revisione protesica

*'La cultura della
revisione'*

*Paolo Rossi
Simone Spolaore
Davide Bonasia
Gianluca Collo*

CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELL'ANCA (S.I.d.A.)

**"LA DISPLASIA CONGENITA DELL'ANCA:
RITORNO AL FUTURO"**

BARI, 6-7 DICEMBRE 2013
Sheraton Nicolaus Hotel & Conference Center

PRESIDENTE ONORARIO: Prof. Carmelo Simone

PRESIDENTE: Prof. Biagio Moretti

COORDINATORE SCIENTIFICO: Prof. Giuseppe Solarino

CHIRURGIA DI REVISIONE

- ✓ Alterata anatomia
- ✓ Scarsa qualità ossea
- ✓ Perdita di bone stock
- ✓ Fissazione difficoltosa
- ✓ Migrazione degli impianti
- ✓ Debridement accurato
- ✓ Management infezione

ALTO TASSO DIFFICOLTA'

SCOPO DEL TRATTAMENTO

- ✓ ELIMINARE O RIDURRE IL DOLORE
- ✓ RECUPERARE IL BONE STOCK
- ✓ RIPRISTINARE LA FUNZIONALITA' DELL'ARTO
(centro di rotazione)
- ✓ FORNIRE STABILITÀ ALL'IMPIANTO

Ove presenti:

- ✓ ARRESTARE IL PROCESSO
INFETTIVO
- ✓ RIDURRE LA FRATTURA

PROTESI DOLOROSA: EZIOPATOGENESI

Cause estrinseche

- ✓ Radicolopatie lombari
- ✓ Neuropatie periferiche
- ✓ Lesioni vasculo-nervose
- ✓ Tromboembolismo
- ✓ Borsiti trocanteriche
- ✓ Tendinosi/ tendiniti
- ✓ Ernie inguinali
- ✓ Neoplasie

Cause intrinseche

Clin Orthop Relat Res. 2013 Dec;471(12):3863-9. doi: 10.1007/s11999-013-2935-5.

What are the causes for failures of primary hip arthroplasties in france?

Delaunay C, Hamadouche M, Girard J, Duhamel A; SoFCOT Group.

Department of Orthopaedics, Clinique de l'Yvette, 67-69 Route de Corbeil, 91160, Longjumeau, France, c.delaunay@clinique-yvette.com.

-
1. Scollamento NON INFETTIVO –asettico- (42%)
 2. Scollamento INFETTIVO –settico- (11%)
 3. Usura delle componenti protesiche (11%)
 4. Fratture periprotetichesche (11%)
 5. Lussazione dell'impianto (10%)
 6. Errori di tecnica (6%)
 7. Rottura dell'impianto (3%)

**Revisione TUTTE
le componenti nel
49% casi**

ANAMNESI E PLANNING PRE-OPERATORIO

FONDAMENTALE

ESAME OBIETTIVO

CARTELLA CLINICA INTERVENTO PRECEDENTE
(tipo di impianto utilizzato)

PRECEDENTE DOCUMENTAZIONE RADIOGRAFICA

INFORMARE IL PAZIENTE CHE LA DECISIONE DI REVISIONARE
PARZIALMENTE O TOTALMENTE L'IMPIANTO PROTESICO PUO'
ESSERE PRESA INTRAOPERATORIAMENTE

Un consenso “davvero” informato

La revisione.. perché?

..non siamo stati abbastanza
bravi?

Le protesi possono fallire..

- Aumenta la durata della vita
- Cambiano le aspettative dei pazienti

> numero di primi impianti

Aspettative del paziente

- ✓ Recupero precoce
- ✓ Non problematiche post operatorie
- ✓ Non complicazioni
- ✓ Scomparsa del dolore
- ✓ Incremento della mobilità articolare e funzionalità
- ✓ Durata nel tempo dell'impianto protesico
- ✓ Assenza di limitazioni funzionali post operatorie

Volume 13 • Number 4 • 2010
VALUE IN HEALTH

Patient Expectations and Health-Related Quality of Life Outcomes Following Total Joint Replacement

Marta Gonzalez Sáenz de Tejada, BS,¹ Antonio Escobar, PhD,¹ Carmen Herrera, PhD,² Lidia García, BS,³ Felipe Aizpuru, MD,⁴ Cristina Sarasqueta, MD⁵

I numeri lo confermano

Scientific Articles | July 01, 2005

Prevalence of Primary and Revision Total Hip and Knee Arthroplasty in the United States From 1990 Through 2002

Steven Kurtz, PhD¹; Fionna Mowat, PhD²; Kevin Ong, PhD¹; Nathan Chan, PhD²; Edmund Lau, MS²; Michael Halpern, MPH, MD, PhD³

¹ Exponent Inc., 3401 Market Street, Suite 300, Philadelphia, PA 19104. E-mail address for K. Ong: kong@exponent.com

² Exponent Inc., 149 Commonwealth Drive, Menlo Park, CA 94025

³ Exponent Inc., 1800 Diagonal Road, Suite 355, Alexandria, VA 22314

J Bone Joint Surg Am, 2005 Jul 01;87(7):1487-1497. doi: 10.2106/JBJS.D.02441

Dal 1990 al 2002 in USA: PTA + 50% / 100.000 abitanti

REVISIONI: + 3.7 % PTA /100.000 per 10aa

(media di revisione > rispetto alle PTG, 17.5% VS 8.2%)

Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1534.

[Trends in the number of knee and hip arthroplasties: considerably more knee and hip prostheses due to osteoarthritis in 2030].

[Article in Dutch]

Otten R, van Roermund PM, Picavet HS.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Preventie- en zorgonderzoek, Bilthoven, the Netherlands.

Dal 1995 al 2005 (Paesi bassi) : + 50% PTA

Previsione al 2030: + 149% PTA

Incremento costante nei prossimi 30 anni:

- *età avanzata*

- *"more active lifestyle"*

The changing demographics of total joint arthroplasty recipients in the United States and Ontario from 2001 to 2007

Bheeshma Ravi^a, Ruth Croxford^b, William M. Reichmann^c, Elena Losina^c, Jeffrey N. Katz^c, Gillian A. Hawker^{d,*}

Netto incremento di primi impianti in Pz. giovani

I pazienti spesso sottostimano i possibili problemi

- depressione
- ipomobiltà
- ..dolore (componente psicologica)

Patient Educ Couns. 2007 Dec;69(1-3):196-9. Epub 2007 Oct 29.

Physical activity behavior after total hip arthroplasty (THA): a prediction based on patient characteristics.

Stevens M, Wagenmakers R, Groothoff JW, Bulstra SK, van den Akker-Scheek I, Zijlstra W.

Department of Orthopedics, University Medical Center Groningen, University of Groningen, The Netherlands. m.stevens@orth.umcg.nl

372 pz.

- Età avanzata
- Livello culturale medio-basso
- Vivere da soli

INSODDISFAZIONE ED INATTIVITA'

Athletic Participation After Hip and Knee Arthroplasty

Alexander Golant, M.D., Dimitrios C. Christoforou, M.D., James D. Slover, M.D., and Joseph D. Zuckerman, M.D.

Bulletin of the NYU Hospital for Joint Diseases 2010;68(2):76-83

Meglio sport a basso-impatto (camminata, golf, bowling)
Minori fallimenti in pazienti attivi vs sedentari

QUALI BENEFICI?

biointegrazione
coordinazione
forza muscolare
propiocezione

contrastano l'usura

Alcuni studi però confermano peggior sopravvivenza e aumento delle fratture periprotetiche in soggetti giovani con alte richieste funzionali

OVERUSE (> nel Pz. Giovane con alte richieste)

...fallita la protesi

La prima domanda da porsi non è:

✗ COSA FARE
ma..

✓ COME AFFRONTARE IL PROBLEMA

**E' NECESSARIO PRIMA
FARE DIAGNOSI!**

PERCORSO DIAGNOSTICO

I LIVELLO

Rx
Ematochimici

II LIVELLO

TC
RMN se interessamento tessuti molli
Scintigrafia con Tc99
Scintigrafia con leucociti marcati

III LIVELLO

PET
SPECT/TC
(biopsia e prelievo intrarticolare)

VALUTAZIONE DEFICIT BONE STOCK

*Classificazione del GIR
(Gruppo Italiano Riprotesizzazione)*

CLASS	BONE LOSS
1	Minimal metaphyseal loss Intact diaphysis
2	Extensive metaphysis loss Intact diaphysis
3	Metaphysis severely & nonsupportive A: >4cm proximal to isthmus intact B: <4cm distal to isthmus intact
4	Extensive metaphyseal damage Widened canal Cortical ballooning Thin cortices

Paprosky Classification

VALUTAZIONE DEFICIT BONE STOCK

AAOS Classification of Acetabular Defects⁸

Type I: Segmental

A. Peripheral

B. Central with medial wall defect

Type II: Cavitory

Type III: Combined

Type IV: Pelvic Discontinuity

Type V: Arthrodesis

Acetabular Bone Loss Paprosky

- Type 1
 - ❖ Minor bone loss
- Type 2
 - ❖ A. <2cm superior bone loss
 - ❖ B. 2-3 cm superior bone loss
 - ❖ C. Medial migration
- Type 3
 - ❖ A. >3cm bone loss. Moderate lysis
 - ❖ B. >3cm bone loss. Severe lysis

VALUTAZIONE RADIOGRAFICA STELO FEMORALE

CEMENTATO:

- SCOLLAMENTO COMPLETO (OSTEOLISI CIRCONFERENZIALE)
- SCOLLAMENTO PROBABILE (ZONA RADIOLUCENZA COMPLETA IN ALMENO UNA PROIEZIONE)
- SCOLLAMENTO POSSIBILE (ZONA RADIOLUCENZA IN INTERFACCIA OSSO-CEMENTO COMPRESA FRA 50% E 100%)

NON CEMENTATO:

- OSTEOLISI TERZO MEDIO-DISTALE LINEARE

VALUTAZIONE RADIOGRAFICA COPPA ACETABOLARE

CEMENTATA:

- OSTEOLISI LINEARE (EVOLVE IN CIRCONFERENZIALE)
- MOBILIZZAZIONE PIU' SPESSO A LIVELLO INTERFACCIA OSSO-CEMENTO RISPETTO CHE A PROTESI-CEMENTO

NON CEMENTATA:

- OSTEOLISI DIFFUSA
- PUO' CONTRIBUIRE LA PRESENZA DI FORI PER LE VITI
- SPESSO ACCOMPAGNATA DA ROTTURA DELLE VITI, ROTTURA DELLA CUP METALLICA, ESTESE PERDITE OSSEE

Esami di 1° livello

- Emocromo con formula
- fibrinogeno
- VES
- PCR
- IL-6

- Rx

The use of receiver operating characteristics analysis in determining erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein levels in diagnosing periprosthetic infection prior to revision total hip arthroplasty.

Ghanem E, Antoci V Jr, Pulido L, Joshi A, Hozack W, Parvizi J.

The Rothman Institute of Orthopedics, Thomas Jefferson University, 925 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19107, USA.

VES > 32 mm/sec

PCR > 21 mg/L

**Predittivi per infezione
periprotetica**

VES rimane mossa a lungo, tende a normalizzarsi in 5 mesi dopo l'intervento.

PCR sale 48/72 ore dopo la chirurgia ed impiega 3-4 settimane a normalizzarsi

ESR and CRP

Efficacy of pre- and intra-operative investigations in 202 THA PJI cases

- ▶ If both positive: 83% PPV
- ▶ If both negative: 100% NPV

ESR $\geq$ 32 mm/h and CRP $\geq$ of 21 mg/l are predictive of infection
(DiCesare et al, Ghanem et al)

Test	Sens	Spec	PPV	NPV
ESR	0.82	0.85	0.58	0.95
CRP	0.96	0.92	0.74	0.99

(Spanghel et al. 1999 JBJS Am)

J Bone Joint Surg Am. 2010 Sep 1;92(11):2102-9.

Inflammatory blood laboratory levels as markers of prosthetic joint infection: a systematic review and meta-analysis.

Barbari E, Mabry T, Tsaras G, Spangehl M, Erwin PJ, Murad MH, Steckelberg J, Osmon D.

Section of Orthopedic Infectious Diseases, Mayo Clinic College of Medicine, 200 First Street S.W., Rochester, MN 55905, USA. barbari.elie@mayo.edu

Conclusions: The diagnostic accuracy for prosthetic joint infection was best for interleukin-6, followed by C-reactive protein level, erythrocyte sedimentation rate, and white blood-cell count. Given the limited numbers of studies assessing

**Torna in range
in 72 ore !**

J Bone Joint Surg Br. 2007 Jan;89(1):94-9.

Interleukin-6, procalcitonin and TNF-alpha: markers of peri-prosthetic infection following total joint replacement.

Boettner F, Wegner A, Winkelmann W, Becker K, Erren M, Götze C.

Hospital for Special Surgery, New York 10021, USA. DrBoettner@email.de

IL-6 > 12 pg/ml associata ad alti livelli di PCR dimostra altissima sensibilità per infezione periprotetica.

Esami di 2° livello

...TC

✓ Mobilizzazione

✓ Bone stock

✓ Versione componenti

STUDIO TC bone stock

A.B. 71aa. Mobilizzazione cotile in esiti
reimpianto PTA

Delta TT revision,
liner 10° ,
MoP32mm,
osso omologo

STUDIO TC versione componenti

Mal orientamento del cotile

STUDIO TC/ANGIO-TC vasi

Mobilizzazione cotile in protesi totale d'anca a destra con protrusione delle componenti protesiche nello scavo pelvico in A.R.

TC + AngioTC

L'esame TC mirato alla valutazione del fascio vascolare iliaco-femorale destro in rapporto ...
 In presenza di lussazione inveterata di PTA dx si conferma dislocazione verso la linea mediana dell'arteria iliaca esterna che passa a ponte sulla componente acetabolare, senza immagini di riduzione del suo lume o di spandimento di mdc

Esami di 3° livello

....SCINTIGRAFIA

Eur J Nucl Med. 2001 Mar;28(3):288-93.

Extended combined 99mTc-white blood cell and bone imaging improves the diagnostic accuracy in the detection of hip replacement infections.

Larikka MJ, Ahonen AK, Junila JA, Niemelä O, Hämäläinen MM, Syrjälä HP.

Laboratory, Central Hospital of Länsi-Pohja, Kemi, Finland. martti.larikka@lpshp.fi

Nucl Med Commun. 2001 Oct;22(10):1145-50.

Improved method for detecting knee replacement infections based on extended combined 99mTc-white blood cell/bone imaging.

Larikka MJ, Ahonen AK, Junila JA, Niemelä O, Hämäläinen MM, Syrjälä HP.

LP Central Hospital Laboratory, Kemi, Finland. Martti.Larikka@lpshp.fi

**Tc99 = inflammation
leukocyte = infection**

➔ Se POSITIVA eseguire SCINTI con leucociti marcati

➔ Se NEGATIVA ricercare altre diagnosi. VPN 100%

Radionuclide Scans

▶ Technetium-99 scans

- ▶ Predictive if all 3 phases positive
- ▶ Sensitivity 88%, specificity 90%
 - ▶ “negative scan → no infection”
 - ▶ “positive scan → you don’t know”

▶ Indium-111 Ig or white cell scans

- ▶ Sensitivity and specificity up to 97%
- ▶ Labour intensive and expensive
- ▶ Not in routine use

▶ FDP-PET scans

- ▶ Results in PJI not better than standard Technetium scans
- ▶ Research

(Nagoya et al. 2008 JBJS Br, Oyen et al. 1992 Radiology, Love et al. 2004 J Nuc Med)

Nucl Med Commun. 2011 Sep;32(9):834-9. doi: 10.1097/MNM.0b013e3283496695.

Diagnostic accuracy of combined ^{99m}Tc -sulesomab and ^{99m}Tc -nanocolloid bone marrow imaging in detecting prosthetic joint infection.

Sousa R, Massada M, Pereira A, Fontes F, Amorim I, Oliveira A.

Department of Orthopaedic, Centro Hospitalar do Porto, Hospital Santo António, Oporto, Portugal. ricardojsousa@gmail.com

RESULTS: An isolated ^{99m}Tc -sulesomab scan shows 100% sensitivity (0.40-1) and negative predictive value (0.31-1) but only 20% specificity (0.05-0.48). Combining it with a ^{99m}Tc -nanocolloid bone marrow scan increases the specificity (0.75-1) and the positive predictive value (0.40-1) to 100%. Furthermore, the combined test has fewer equivocal readings and higher interreader agreement: κ test value 0.59 vs. 0.44.

Aumenta la SPECIFICITA' e porta a 100% il VVP

Joint aspiration ?

We recommend joint aspiration of patients being assessed for periprosthetic knee infections who have abnormal ESR and/or CRP results. We recommend that the aspirated fluid be sent for microbiologic culture, synovial fluid white blood cell count and differential.

We recommend a selective approach to aspiration of the hip based on the patient's probability of periprosthetic joint infection and the results of the ESR and CRP. We recommend that the aspirated fluid be sent for microbiologic culture, synovial fluid white blood cell count and differential.

Strength of recommendation: **STRONG**

Joint aspiration - White blood cell count (WBC)

- ▶ Variable sensitivity from 36-89%
- ▶ Depending on the **cut-off** point used
 - ▶ Late chronic infection (Type II) → $> 3.0 \times 10^9/L$
 - ▶ Acute infection (Types I and III) → $> 27.8 \times 10^9/L$
 - ▶ % polymorphonuclear (PMN) cells → $> 88 \%$

**Se persistono dubbi
Attenersi alle linee guida!**

COPYRIGHT © 2011 BY THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY, INCORPORATED

AAOS
AMERICAN ACADEMY OF
ORTHOPAEDIC SURGEONS

AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS
CLINICAL PRACTICE GUIDELINE ON

The Diagnosis of Periprosthetic Joint Infections of the Hip and Knee

Craig Della Valle, MD
Javad Parvizi, MD
Thomas W. Bauer, MD, PhD
Paul E. DiCesare, MD
Richard Parker Evans, MD
John Segreti, MD
Mark Spanghel, MD

William C. Watters III, MD
Michael Keith, MD
Charles M. Turkelson, PhD
Janet L. Wies, MPH
Patrick Sluka, MPH
Kristin Hitchcock, MSI

AAOS Guideline on The Diagnosis of Periprosthetic Joint Infections of the Hip and Knee

**E affidarsi SEMPRE ad un
buon infettivologo!**

Il rettore Honsell: «L'infettivologia diventerà un punto di alta qualificazione per la facoltà di Medicina e l'ateneo friulano»

Aprire il reparto malattie infettive
Lunedì i primi pazienti saranno ricoverati nei 13 posti letto allestiti nel padiglione universitario

INFEZIONE

FATTORI DI RISCHIO

- ✓ Obesità
- ✓ Diabete
- ✓ Osteonecrosi
- ✓ Alcolismo
- ✓ Artrite reumatoide
- ✓ Immunosoppressori
- ✓ Prolungamento tempi intervento

...

- IMMEDIATA <4 sett
- PRECOCE 4sett-2anni
- TARDIVA >2 anni
- TAMPONE+/CLINICA-

SUPERFICIALE
PROFONDA

Fitzgerald et al: JBJS Am 1977; 59(7):847-855.

Tsukayama et al: JBJS Am 2003; 85A(suppl 1):S75-S80.

REVISIONE CHIRURGICA

PRECOCE
TARDIVA

ONE STEP or TWO STEP

2 STEP

VANTAGGI

- ✓ Aspettare effetti del trattamento ATB
- ✓ Miglior controllo infezioni
- ✓ Miglior management tessuti molli

- ✓ Lunghe ospedalizzazioni
- ✓ Maggior morbidity perioperatoria
- ✓ Almeno 2 interventi
- ✓ Maggiori costi

SVANTAGGI

TEMPI FONDAMENTALI

Primo intervento

Rimozione protesi e
impianto spaziatore

Periodo intermedio

Trattamento ATB

Secondo intervento

Reimpianto protesi

ROYAL AIR FORCE

STRIKE HARD STRIKE SURE

1. PROTESI DOLOROSA

M.P.L. 62aa. PTA sinistra dolorosa, integrata e stabile.
Probabile sovradimensionamento STELO

CHE FARE ?

What proportion of patients report long-term pain after total hip or knee replacement for osteoarthritis? A systematic review of prospective studies in unselected patients.

Beswick AD, Wylde V, Gooberman-Hill R, Blom A, Dieppe P.

School of Clinical Sciences, University of Bristol, Bristol, UK.

PRIMI IMPIANTI DOLOROSI

9% Anca

20% Ginocchio

10-16% Spalla

Procedere ad una diagnosi di esclusione ed impostare un trattamento conservativo

N.B. monitorare il Pz. nel tempo

- ✓ Escludere un processo infettivo in atto
- ✓ Escludere mobilitazione delle componenti
- ✓ Escludere altre cause (ematoma, sciatalgia)

dopo trattamento incruento infruttuoso e indagini diagnostiche
NEGATIVE PER INFEZIONE...

...REVISIONE STELO FEMORALE (Wagner)

Rx post - op

N.B. tampone intraoperatorio negativo.

Rx a 3 mesi

Non più dolore nella deambulazione

B.A.G. 82aa. Mobilizzazione asettica stelo PTA

Rx a 1 anno

S.P. 52aa. Mobilizzazione asettica cotile destro in A.R. e PTA bilaterale

- distacco intraoperatorio del gran trocantere.
- n.3 tamponi di sala NEG.

C.E. 72aa. Mobilizzazione asettica cotile destro

CHE FARE?

RIPOSIZIONARE COTILE NELLA MEDESIMA SEDE?

Valutare il tipo di Pz, età, richieste funzionali

Wagner Trilogy (cup 44 mm con 2 viti da 20 mm, stelo 14
lunghezza 22, testa 28, accoppiamento cer -cer), osteotomia di
accorciamento sotto-trocanterica, e stabilizzazione con placca
LCP e cerchiaggi

Prevedere gli imprevisti e/o le complicanze

2. SCOLLAMENTO SETTICO

5 litri

V.E. 69aa. Mobilizzazione PTA sinistra settica

tampone di sala + per *Pseudomonas* ssp.

Rx a 2 mesi post op

dopo terapia Atb e.v. e OK infettivologico.. REIMPIANTO
con Trilogy-Wagner ai 7 mesi.

3. WEAR

THE JOURNAL OF BONE & JOINT SURGERY • JBJS.ORG
VOLUME 94-A • NUMBER 18 • SEPTEMBER 19, 2012

Corrosion at the Head-Neck Taper as a Cause for Adverse Local Tissue Reactions After Total Hip Arthroplasty

H. John Cooper, MD, Craig J. Della Valle, MD, Richard A. Berger, MD, Matthew Tetreault, BA,
Wayne G. Paprosky, MD, Scott M. Sporer, MD, and Joshua J. Jacobs, MD

- ✓ Difficile QUANTIFICARE il danno.
- ✓ Rx sottostima il danno litico.
- ✓ Ausilio TC e RMN
- ✓ Dosaggio ioni metallici su sangue ed urine (tossicità?)

Fretting corrosion of CoCrMo and Ti6Al4V interfaces

Viswanathan Swaminathan^{a,b}, Jeremy L. Gilbert^{a,b,*}

^aDepartment of Biomedical and Chemical Engineering, Syracuse University, Syracuse, NY, USA

^bSyracuse Biomaterials Institute, Syracuse University, Syracuse, NY, USA

Ti6Al4V/ Ti6Al4V
maggior tasso di fretting

CoCr/CoCr e Ti6Al4V/CoCr a
scalare

Fretting corrosion of different material couples was affected by normal load and motion conditions at the interface. Among different material combinations, Ti6Al4V/Ti6Al4V couple reported higher fretting currents, higher friction, and lowest work done per cycle compared to CoCrMo/CoCrMo and Ti6Al4V/CoCrMo couples.

Femoral Stem Fracture and In Vivo Corrosion of Retrieved Modular Femoral Hips

J. Caitlin Huot Carlson, MS, Douglas W. Van Citters, PhD, John H. Currier, MS, Amber M. Bryant, BE, Michael B. Mayor, MD, and John P. Collier, DE

- ✓ Sopravvivenza correlata alla gravità della corrosione alla giunzione stelo-sleeve ($p < 0,002$), non a livello testa-collo
- ✓ Corrosione correlata al livello di attività del paziente
- ✓ Corrosione maggiore nelle testine CoCr (vs. cer),

Abstract: A series of 78 retrieved modular hip devices were assessed for fretting and corrosion. Damage was common at both the head-neck junction (54% showing corrosion; 88% showing fretting) and at the stem-sleeve junction (88% corrosion; 65% fretting). Corrosion correlated to in vivo duration, patient activity, and metal (vs ceramic) femoral heads but did not correlate to head carbon content. Femoral stem fatigue fracture was observed in seven retrievals; all had severe corrosion, were under increased stress, and were in vivo longer than the non-fractured cohort.

Metal Ion Release With Large-Diameter Metal-on-Metal Hip Arthroplasty

Pascal-André Vendittoli, MD, MSc, FRCS(C),* Traian Amzica, MD,*
Alain G. Roy, MD, FRSC(C),* Daniel Lusignan, RN,* Julien Girard, MD,†
and Martin Lavigne, MD, FRCS(C)*

LDH-THA vs HR

Livelli medi di cobaltemia aumentati 3,3 volte nel gruppo LDH-THA

L'introduzione di uno sleeve
aumenta fortemente il rilascio
di ioni metallo

Third-body wear

Journal of Biomechanics 41 (2008) 2090–2096

Effects of episodic subluxation events on third body ingress and embedment in the THA bearing surface

Anneliese D. Heiner^{a,b,*}, Hannah J. Lundberg^{a,b,1}, Thomas E. Baer^a,
Douglas R. Pedersen^{a,b}, John J. Callaghan^{a,b,c}, Thomas D. Brown^{a,b}

Fino al 66% dei cotili espiaantati presenta “rim indentation” da impingement

Episodi ripetuti di instabilità in caso di impingement causano l'accesso del particolato all'interfaccia e determinano l'usura da terzo corpo

2009 Nicolas Andry Award

Clinical Biomechanics of Third Body Acceleration of Total Hip Wear

Thomas D. Brown PhD, Hannah J. Lundberg PhD,
Douglas R. Pedersen PhD, John J. Callaghan MD

Nella sublussazione (<0,6mm), il particolato sospeso viene trasportato nello spazio articolare

Journal of Biomechanics 41 (2008) 2090–2096

Effects of episodic sublucation events on third body ingress and embedment in the THA bearing surface

Anneliese D. Heiner^{a,b,*}, Hannah J. Lundberg^{a,b,1}, Thomas E. Baer^a,
Douglas R. Pedersen^{a,b}, John J. Callaghan^{a,b,c}, Thomas D. Brown^{a,b}

- Bone cement
- Radiopacifier particles
- Bone particles
- Trochanteric reattachment wires
- Burnishing from loose stems
- Hydroxyapatite particles
- Fixation screw fretting
- Neck impingement
- Matte/precoat stem abrasion
- Instrument scratching
- Modular connection fretting
- Cutting guide abrasion
- Porous coating particles
- Locking mechanism breakage
- Microseparation impact
- Assembly/impaction chipping

B.G. 80aa. lussazione inveterata PTA in esiti scollamento
asettico

Rx post-op

Rx 6 mesi

- ✓ Modularità: risorsa importante ma soggetta a fretting corrosion. da utilizzare in POCHI casi selezionati.

~~Sleeves~~

- ✓ third body wear: problema, rilevante in MoM e Mop, spesso non dominabile

- ✓ *Design protesico*
- ✓ *Mezzi di sintesi accessori*
- ✓ *Dinamica articolare*
- ✓ *Pregressi impianti*
- ✓ *Strumentari*
- ✓ *Materiali*

4. FRATTURE PERIPROTESICHE

ACETABOLO 0,8%
FEMORE 7-8%

CLASSIFICAZIONE DI
VANCOUVER
INTRAOPERATORIA

CLASSIFICAZIONE DI VANCOUVER POST-OPERATORIA

A REGIONE TROCANTERICA

- A1 GRAN TROCANTERE
- A2 PICCOLO TROCANTERE

B DIAFISI FEMORALE

- B1 PROTESI STABILE
- B2 PROTESI INSTABILE
- B3 PROTESI CON DIFETTO OSSEO

C TERZO INFERIORE DEL FEMORE

D.M.G. 70aa. Frattura - lussazione PTA

1° impianto

*IV giornata post op CADUTA ACCIDENTALE
-LUSSAZIONE
-STELO INSTABILE*

Reimpianto in VIII
giornata

INFEZIONE

Cemento spaziatore
dopo 8 mesi
dal reimpianto

Rx a 7gg.

2° reimpianto

Rx a 2 mesi

5. INSTABILITA' (LUSSAZIONI RECIDIVANTI)

- ✓ Capire la causa
- ✓ TC pre-op (valutazione versioni)

***NESSUN COMPROMESSO
sostituire le componenti mal posizionate***

6. ERRORI DI TECNICA

M.R. 74aa. Mal orientamento del cotile

REIMPIANTO COTILE ABG II 52 + sostituzione testina +4/32, spike
e 1 vite CoC)

Rx 6 mesi

7. ROTTURA COMPONENTI

**AVERE IN SALA OPERATORIA
TUTTO IL MATERIALE
NECESSARIO CONSIDERANDO
LA PEGGIORE DELLE IPOTESI
POSSIBILI!**

Ripley's

Believe It

or Not!

LONDON

Conoscere l'impianto da rimuovere

(testina, accoppiamento, diametri, cono-morse)

G.T. 85aa.

Lussazione PTA in
esiti reimpianto
cotile

Obiettivo pre-op: sostituire solo inserto PE

Intervento: rimozione sistema Octopus, sostituzione testina, impianto cotile Lepine cementato.

Rx post - op

Strumentario per espianto

Cotili e steli da revisione

PLACCHE/CERCHIAGGI

A.E. 82aa. lussazione inveterata stelo PTA sinistra

.. complicanza intraoperatoria
BRILLANZA SUBITO

.. E si procede a CERCHIAGGIO DISTALE

Rx post - op

Rx a 5 mesi

TC + AngioTC

L'esame TC mirato alla valutazione del fascio vascolare iliaco-femorale destro in rapporto ...
 In presenza di lussazione inveterata di PTA dx si conferma dislocazione verso la linea mediana dell'arteria iliaca esterna che passa a ponte sulla componente acetabolare, senza immagini di riduzione del suo lume o di spandimento di mdc

In relazione al tipo di Pz.. Limitarsi al MINIMO INDISPENSABILE

In qualche caso purtroppo siamo costretti a desistere

B.N. 82aa. PTA sin infetta a 5 anni post revisione

Dalla sala direttamente in Rianimazione per complicanza anestesiológica.

Esegue Rx post op in reparto in II giornata. (lussazione spaziatore, indicazione a trattamento incruento.)

Rx a 8 mesi.

Conclusioni

- ✓ *Il reimpianto d'anca e' una chirurgia complessa, non sempre prevedibile.*
- ✓ *Una corretta diagnosi, seguendo i percorsi noti, evita complicanze ed errori*
- ✓ *Se si verificano bisogna saperli gestire*
- ✓ *Se necessario, sapersi fermare in tempo*

IMAGINATION

IS MORE IMPORTANT
THAN KNOWLEDGE

GRAZIE